


Preocupación menor

Ficha 10 Characiformes: Characidae

LC **Sardinita**

Bryconamericus cismontanus EIGENMANN 1914



Descripción y diagnóstico. Son peces pequeños, con hasta 60 mm LE. El carácter más distintivo es una mancha pequeña de color naranja ubicada en la parte dorsal del pedúnculo. Cuerpo grácil, ovoide y alargado. Plateados y con el dorso un tanto oliváceo. Tienen una mancha humeral alargada verticalmente y difuminada en sus márgenes. Una franja blanca verdosa recorre el cuerpo desde la mancha humeral hasta la base de la aleta caudal. Las aletas son translúcidas y con bordes blancos, principalmente las pélvicas y la anal. La aleta caudal es grande y en su base los radios centrales son negros casi hasta la mitad de la horquilla.

Distribución general. La localidad típica es Villavicencio, cuenca del Orinoco, Colombia. También es reportada en drenajes al mar Caribe.

Distribución y abundancia local. Distribución: difundida. Registrada en todas las cuencas locales. Habita en las planicies y el piedemonte, no es registrada en tierras elevadas. Abundancia: frecuente a dominante. En algunos ambientes son muy numerosos.

Hábitat. Litorales y pelágicos. Habitan en ambientes someros y litorales con aguas cristalinas. Prefieren áreas de corriente moderada con sustratos variados. Siempre en movimiento. En grupos pequeños o grandes.

Alimentación y reproducción. Omnívoros con tendencia a la carnivoría. Los peces de este género comen principalmente insectos en fases inmaduras (dípteros y efemerópteros), pero también semillas. Reproducción oportunista. La fecundidad suele ser baja, de unos cuantos centenares de huevos.

Importancia y usos. Con interés como pez de ornato.

Tendencias y amenazas. No existen cambios relevantes en su abundancia. Las amenazas son las relativas a las especies que dependen de la deriva.

Comentarios. Otras especies de *Bryconamericus* se registran en las cuencas locales, como *B. alpha* y *B. charalae*, esta última es endémica en la cuencas de Aroa y Yaracuy y muy parecida a *H. jabonero*. Los *Bryconamericus* tienen historias de vida similares. Al parecer *B. alpha* prefiere los ríos en las planicies, con corrientes moderadas, también los arroyos sombríos.



Cita sugerida: Rodríguez-Olarte, D. & D. C. Taphorn. 2007. Los peces de Aroa y Yaracuy: una guía para su conservación. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) & Iniciativa de Especies Amenazadas (IEA-PROVITA). Barquisimeto, Venezuela. Primera edición digital: septiembre 2007. Primera edición impresa: Septiembre 2011.