


Preocupación menor

Ficha 19
LC Characiformes: Lebiasinidae
Carpa criolla, carpilla
Lebiasina erythrinoides (VALENCIENNES) 1850



Descripción y diagnóstico. Fácilmente distinguible por el tamaño y su cuerpo fusiforme. Generalmente entre 80 y 130 mm LE, pero pueden alcanzar hasta los 250 mm LE. La coloración es verde oliváceo en el dorso y tiene una llamativa línea clara -amarilla o dorada- por el medio del dorso que es distintiva. Tiene una franja lateral oscura, extendida desde el borde del opérculo hasta el pedúnculo caudal. Por arriba de esta franja tiene una banda clara e irregular. Los flancos tienen hileras discontinuas de manchas con colores desde naranja oscuro hasta mostaza. La base de la aleta caudal tiene escamas extendidas y una mancha redondeada negra e intensa. El lóbulo superior de la aleta caudal es más alargado que el inferior. La aleta dorsal tiene una mancha negra e intensa cerca de la base y en los primeros radios. Las aletas son de color amarillo naranja con bordes blancos. La aleta caudal puede tener tonos rojizos oscuros.

Distribución general. La localidad típica es en las riberas del lago de Maracaibo, sierra de Perijá. Muy extendida. Presente en otras cuencas regionales, así como en la cuenca del Orinoco, principalmente Apure. También en el Noroeste de Colombia.

Distribución y abundancia local. Distribución: difundida. Ampliamente distribuida en todos los ríos de las cuencas locales, excepto en la cuenca baja de los ríos más grandes, las desembocaduras y estuarios. No habita en ambientes muy perturbados. Abundancia: dominante. Es muy abundante en arroyos de montaña y en el piedemonte.

Hábitat. Usualmente epipelágicos y litorales. Común en los ríos sombríos. Prefiere áreas litorales en las corrientes, pero también en pozos y remansos. Ocupa desde hábitats someros hasta pozos profundos. De usual se asocia con sustratos variados pero generalmente con presencia de refugios.

Alimentación y reproducción. Especie omnívora con una dieta basada en artrópodos, principalmente terrestres (hormigas), flores, frutos y eventualmente crustáceos y peces pequeños. Hace recorridos litorales cerca de la superficie esperando presas que caigan del bosque o las riberas. Reproducción periódica. Alcanza la madurez en doce meses. Tienen dimorfismo sexual: los machos son más coloridos, pequeños y con la base de la aleta anal más grande; también tienen una hilera de escamas modificadas a los lados de la base de la aleta anal. La fecundidad se estima en unos 2700 huevos y desovan en los primeros meses del período de lluvias, incluso dos veces durante el mismo período.

Importancia y usos. Es usual en la pesca de subsistencia, principalmente en arroyos de montaña.

Tendencias y amenazas. Sus poblaciones no han tenido cambios importantes. Dada la dependencia del material alóctono en su dieta, estos peces pueden ser afectados por la pérdida de bosque ribereño. Su ausencia en algunos ríos ha sido relacionada con la pérdida del hábitat acuático.

Comentarios. Fue originalmente descrita en el género *Piabucina*.



Cita sugerida: Rodríguez-Olarte, D. & D. C. Taphorn. 2007. Los peces de Aroa y Yaracuy: una guía para su conservación. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) & Iniciativa de Especies Amenazadas (IEA-PROVITA). Barquisimeto, Venezuela. Primera edición digital: septiembre 2007. Primera edición impresa: Septiembre 2011.