




Preocupación menor

Ficha 22
LC

Siluriformes: Heptapteridae

Puyón, bagre

Pimelodella odynea (BLOCH) 1794



Descripción y diagnóstico. El más común de los bagres desnudos (sin escamas o placas en el cuerpo). Pueden alcanzar hasta los 130 mm LE. Difiere de otros miembros de la familia en tener el hueso supraoccipital largo, delgado y en contacto con la placa ósea justo anterior a la espina de la aleta dorsal, formando un puente continuo en la línea mediodorsal. Poseen barbillas maxilares muy largas y dos pares de barbillas mentonianas. Una línea negra, usualmente intensa, parte desde la boca, cruza por los ojos y extiende por los costados. La aleta adiposa está claramente separada de la aleta dorsal y el lóbulo superior de la aleta cauda es más alargado que el inferior, al contrario que *Rhamdia quelen*.

Distribución general. La localidad típica es en el río San Juan, cuenca de Motatán, sistema del lago de Maracaibo. Registrado en la costa de los estados Falcón y Yaracuy.

Distribución y abundancia local. Distribución: difundida. Registrado en todos los ríos de las cuencas locales, excepto en las tierras elevadas. Abundancia: Frecuente a dominante. Pueden ser muy abundantes en algunos ambientes.

Hábitat. Epibentónicos. Ocurren en muy variados ambientes, desde fondos de hojarasca y troncos, hasta sustratos pedregosos. En los ríos prefieren zonas de remanso y corrientes bajas. Refugiados o recorriendo los fondos lentamente. En algunas ocasiones pueden formar grupos muy grandes que se mantienen frente a las corrientes que ingresan a los pozos. Tolerantes.

Alimentación y reproducción. Omnívoros, con tendencia a la carnivoría. Se alimentan de material vegetal, moluscos, insectos acuáticos y terrestres, principalmente los transportados por la deriva. Se desconocen aspectos de su reproducción, pero se conoce

que en los peces del género ocurre durante el período de lluvias y algunas especies pueden desovar varias veces durante el período.

Tendencias y amenazas. Poblaciones estables, no se evidenciaron cambios relevantes en las mismas durante el lapso de estudio.

Importancia y usos. Eventual en la pesca de subsistencia.

Comentarios. Las espinas puntiagudas en la aleta dorsal y en las pectorales de esta especie pueden causar una herida muy dolorosa, y por lo tanto este bagrecito merece mucho respeto al ser manipulado. Hay indicaciones que las poblaciones de las cuencas de los ríos Aroa, Yaracuy y Tocuyo podrían ser distintas taxonómicamente de las de la cuenca del lago de Maracaibo.



Cita sugerida: Rodríguez-Olarte, D. & D. C. Taphorn. 2007. Los peces de Aroa y Yaracuy: una guía para su conservación. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) & Iniciativa de Especies Amenazadas (IEA-PROVITA). Barquisimeto, Venezuela. Primera edición digital: septiembre 2007. Primera edición impresa: Septiembre 2011.