

ENDÉMICO


Preocupación menor

Ficha 27
LC

Siluriformes: Loricariidae

Pore, corroncho

Hypostomus pagei ARMBRUSTER 2003



Descripción y diagnóstico. Peces que alcanzan hasta 240 mm LE. En las cuencas locales se distinguen de otros corronchos grandes por la boca pequeña y la ausencia de aditamentos en la cabeza, como los odontodos desarrollados o los tentáculos en el hocico. Cuerpo aplanado ventralmente y comprimido posteriormente. Cubierto de varias series de placas imbricadas. Boca ventosa ventral con dientes en forma de cuchara. Color desde marrón oscuro hasta amarillo mostaza. Generalmente con puntos de tamaño variable y dispersos por todo el cuerpo, incluyendo las aletas. Los individuos son más claros cuando tienen mayor tamaño, así como también en los ríos grandes de las planicies y en la desembocadura.

Distribución general. La localidad típica es en el río Tupe, cuenca de Aroa. Registrado en todas las cuencas locales y algunas regionales (Tocuyo).

Distribución y abundancia local. Distribución: difundida. Ocurren en las planicies, piedemontes y desembocaduras al mar. Abundancia: frecuente. Se observan con mayor abundancia y tamaños individuales en los ríos más grandes de las planicies.

Hábitat. Bentónicos. Viven en zonas de corriente baja, remansos o pozos, con aguas tanto claras como turbias. Asociado a muy diferentes sustratos: ramas y troncos, arena, piedras y fango. Utiliza cuevas en los taludes de los cauces. Solitarios, se desplazan lentamente por el fondo y permanecen inmóviles, pero pueden ser muy rápidos en la huida. Tolerantes a las perturbaciones moderadas y también a la salinidad.

Alimentación y reproducción. Herbívoros especializados en comer madera. En los peces de este género los dientes móviles le sirven para raspar los troncos y comer madera, aunque también ingieren algas. Sus intestinos albergan microorganismos que les permite

digerir la celulosa de las plantas. Se distinguen cuando están adosados a troncos y piedras. Los *Hypostomus* tienen baja a moderada fecundidad, comúnmente con menos de 4000 huevos.

Importancia y usos. Este corroncho es apreciado en la pesca de subsistencia, siendo capturado con redes y arpón neumático.

Tendencias y amenazas. No se registran cambios importantes en la abundancia para la especie.

Comentarios. Las observaciones sugieren que esta especie posiblemente sea simpátrica con otra del mismo género en las cuencas bajas.



Cita sugerida: Rodríguez-Olarte, D. & D. C. Taphorn. 2007. Los peces de Aroa y Yaracuy: una guía para su conservación. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) & Iniciativa de Especies Amenazadas (IEA-PROVITA). Barquisimeto, Venezuela. Primera edición digital: septiembre 2007. Primera edición impresa: Septiembre 2011.