



ENDÉMICO


Casi amenazado

Ficha 4
NT

Characiformes: Characidae

Paletica, sardinita

Hyphessobrycon fernandezi FERNÁNDEZ-YÉPEZ 1950



Descripción y diagnosis. Sardinitas pequeñas, generalmente con menos de 50 mm LE, con cuerpo ovoide y alargado, el cual es reticulado gris oliváceo en el dorso y blanco plateado en el abdomen. En las cuencas locales se distingue de otros pequeños carácidos por una línea lateromedial oscura desde el borde del opérculo (donde es más intensa) hasta el pedúnculo caudal. Por encima de esta línea presenta una franja plateada brillante. Tiene una mancha conspicua, a menudo difusa, al final del pedúnculo y en el origen de los radios centrales de la aleta caudal. Aletas translúcidas, a veces algo amarillentas.

Distribución general. No se conoce la localidad típica, pero fue descrita para la cuenca de Yaracuy. Ocurre en las cuencas locales (Aroa) y presumiblemente en las regionales (Tocuyo).

Distribución y abundancia local. Distribución: difundida. Registrada en piedemontes, planicies y desembocaduras. No ocurre en cuencas altas. Abundancia: ocasional. Son muy escasos, con una abundancia relativa menor al 5%.

Hábitat. Pelágicos, con preferencia a las áreas litorales. Frecuentan pozos y remansos, generalmente asociados a refugios y la sombra de los árboles ribereños. Tienen tolerancia moderada a la salinidad. Solitarios.

Alimentación y reproducción. Omnívoros. Se alimentan en diferentes secciones de la columna de agua. Reproducción desconocida, se presume periódica y en sincronía con el período de lluvias.

Importancia y usos. Con potencialidad para el ornato.



Tendencias y amenazas. Dada la muy baja frecuencia de aparición en los registros, no se reconocen tendencias en la abundancia. Al ser omnívoro es susceptible a que la pérdida del bosque ribereño y los cambios en el sustrato afecten sus poblaciones.

Comentarios. En las cuencas regionales se ha descrito una nueva especie del género: *Hyphessobrycon paucilepis* García-Alzate, Román-Valencia et Taphorn 2008, la cual es muy parecida a *H. fernandezi* pero se ha registrado en ambientes al norte de la cuenca media del río Tocuyo, principalmente en la depresión de Carora. La paletica *Hyphessobrycon paucilepis* ha sido registrada en hábitats con diferentes grados de perturbación (arroyos, lagunas, manantiales salinos, etc.), usualmente asociados a la vegetación emergente. En algunos casos son abundantes.



Cita sugerida: Rodríguez-Olarte, D. & D. C. Taphorn. 2007. Los peces de Aroa y Yaracuy: una guía para su conservación. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) & Iniciativa de Especies Amenazadas (IEA-PROVITA). Barquisimeto, Venezuela. Primera edición digital: septiembre 2007. Primera edición impresa: Septiembre 2011.